





المرضى الكبار الذين يعانون من ضغط دم مرتفع، سكري من نوع ٢ وبرتيين في البول

يبدأ العلاج عادة بإستعمال ٥٠ ملغ لوسارتان (قرص واحد من **لوتان ٥٠**) مرة في اليوم.

لدى مرضى معينين هناك حاجة أحياناً إلى رفع الجرعة الدوائية إلى ١٠٠ ملغ لوسارتان (قرص واحد من **لوتان ١٠٠**) مرة في اليوم، حسب تأثير الدواء على ضغط الدم.

بالإمكان تناول لوسارتان سوية مع أدوية أخرى لتخفيف ضغط الدم (مثلاً، مدرات للبول، حاجبات قنوات الكالسيوم، حاجبات ألفا أو حاجبات بيتا ومستحضرات ذات فعالية مركزية)، وأيضاً مع إنسولين وأدوية أخرى التي تستعمل بشكل شائع لتخفيض مستوى الجلوكوز في الدم (مثلاً، سولفونيل أوريا، جليتازون وحاجبات جلوكوزيداز).

**المرضى الكبار الذين يعانون من قصور القلب**

يبدأ العلاج عادة بإستعمال ١٢.٥ ملغ لوسارتان (قرص واحد من **لوتان ١٢.٥**) مرة في اليوم. عادة، ينبغي زيادة الجرعة كل أسبوع، خطوة تلو الأخرى (مما يعني ١٢.٥ ملغ لليوم خلال الأسبوع الأول، ٢٥ ملغ لليوم خلال الأسبوع الثاني، ٥٠ ملغ لليوم خلال الأسبوع الثالث، ١٠٠ ملغ لليوم خلال الأسبوع الرابع، ١٥٠ ملغ لليوم خلال الأسبوع الخامس) حتى الوصول إلى الجرعة الدوائية الدائمة التي حددها طبيبك. الجرعة الدوائية العظمية هي ١٥٠ ملغ (ثلاثة أقراص من **لوتان ٥٠** ملغ)، مرة في اليوم.

عند علاج قصور القلب، يُعطى لوسارتان غالباً بمشاركة مدر للبول (و/أو ديجيتاليس) الذي يساعد على تقوية وتحسين نجاعة عمل القلب) و/أو حاجب بيتا.

**الجرعة الدوائية لدى فئات خاصة من المرضى**

من شأن الطبيب أن يوصي بجرعة دوائية أقل، خاصة عند بدء العلاج لدى مرضى معينين، مثل هؤلاء الذين يتعالجون بجرعات دوائية عالية من المدرات البولية، لدى مرضى لديهم خلل في الكبد أو لدى مرضى تزيد أعمارهم عن ٧٥ سنة. لا يجوز إستعمال لوسارتان لدى مرضى لديهم خلل خطير في الكبد (أنظر الفقرة ١-٢ ،لا تتناول لوتان إذا).

**لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.**

**طريقة الإعطاء**

يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل مع كأس من الماء. عليك محاولة تناول الجرعة الدوائية اليومية الخاصة بك في نفس الوقت تقريباً من كل يوم. من المهم مواصلة تناول لوتان حتى يخبرك الطبيب خلاف ذلك.

**لوتان ١٢,٥ ملغ**: لا يجوز شطر القرص.

**لوتان ٥٠، ١٠٠**: لوتان ١٠٠ عند الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري.

لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

**إذا تناولت أكثر مما يتوجب عليك تناوله من لوتان**

أعراض فرط الجرعة هي: إنخفاض ضغط الدم، تزايد النبض، من الجائز حدوث إنخفاض في النبض.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

**إذا نسيت تناول لوتان**

إذا نسيت تناول الجرعة الدوائية اليومية، فلا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الموعد الاعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصيات الطبيب.

**كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟**

من المهم مواصلة تناول لوتان لطالما يصفه لك طبيبك للحفاظ على السيطرة على ضغط دمك.

**لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.**
**ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.**

**إذا توفرت لديك أية أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي.**

**٤)الأعراض الجانبية**

كما بكل دواء، إن إستعمال **لوتان** قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أبأ منها.

**يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ القريبة إذا ظهر:**

رد فعل تحسسي خطير (طفح، حكة، إنتفاخ الوجه، الشفتين، الفم أو الحنجرة التي قد تؤدي إلى صعوبات في البلع أو في التنفس)، هذا عرض جانبي خطير لكنه نادر الذي يظهر بشيوع قدره ١٠-١٠٠ متعالجين من بين ١٠٠٠ قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ أو المبيت في المستشفى.

بلغ عن حدوث الأعراض الجانبية التالية بإستعمال لوتان:

*شائعة (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين ١٠):*

دوار؛ ضغط دم منخفض (خاصة بعد حدوث تزايد في فقدان الماء من الجسم من داخل الأوعية الدموية، على سبيل المثال لدى مرضى لديهم قصور قلبي شديد أو يخضعون للعلاج بجرعات دوائية مرتفعة من المدرات البولية)؛ أعراض لضغط دم منخفض المتعلقة بالجرعة الدوائية مثل، إنخفاض ضغط الدم الذي يظهر عند القيام من وضعية الإستلقاء أو الجلوس؛ إنهاك؛ إرهاق؛ إنخفاض نسبة السكر في الدم أكثر مما ينبغي (hypoglycemia)؛ ارتفاع نسبة اليوتاسيوم أكثر مما ينبغي في الدم (hyperkalemia)؛ تغيرات في وظيفة الكلية، بما ذلك قصور الكلى؛ إنخفاض في عدد خلايا المصل واليوتاسيوم في المصل لدى مرضى لديهم قصور قلبي غير شائعة (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين ١٠٠ شخص)؛ ميل للنوم؛ صداع؛ اضطرابات في النوم؛ شعور بتزايد نظم القلب (خفقان)؛ ألم شديد في الصدر (angina pectoris)؛ ضيق التنفس (dyspnoea)؛ ألم في البطن؛ إمساك شديد؛ إسهال؛ غثيان؛ تقبؤ؛ حكة (urticaria)؛ طفح؛ إنتفاخ موضعي (وذمة)؛ سعال

*نادرة (قد تؤثر على شخص واحد من بين ١٠٠٠ شخص):*

فرط الحساسية؛ وذمة وعائية؛ التهاب الأوعية الدموية (التهاب وعائي، بما في ذلك **Henoch-Schönlein purpura**)؛ خدر أو الشعور بالوخز (paraesthesia)؛ إنغماء (syncope)؛ لنض سريع جدا وغير مننظم (رجفان أذيني)؛ سكتة؛ التهاب الكبد (hepatitis)؛ ارتفاع في مستوى الألتين أمينو ترانسفيراز (ALT) في الدم، الذي يزول عادة مع التوقف عن العلاج.

*غير معروفة (لا يمكن تقدير الشيوع من المعلومات المتوفرة):*

إنخفاض في عدد صفيحات الدم؛ شقيقة؛ اضطرابات في وظيفة الكبد؛ آلام في العضلات والمفاصل؛ أعراض تشبه الإنفلونزا؛ آلام في الظهر والتهاب في المسالك البولية؛ زيادة في الحساسية للشمس (photosensitivity)؛ آلام عضلية مجهولة السبب تترافق ببول داكن (بلون الشاي) (rhabdomyolysis)؛ عجز جنسي؛ التهاب البنكرياس (pancreatitis)؛ إنخفاض مستويات الصوديوم في الدم (hyponatraemia)؛ إكتئاب؛ شعور عام غير جيد؛ رنين؛ أزيز، دوي أو قرع في الأذنين؛ (إضطراب في التذوق إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

the pancreas (pancreatitis)؛ low levels of sodium in the blood (hyponatraemia)؛ depression؛ generally feeling unwell؛ ringing, buzzing, roaring, or clicking in the ears (tinnitus)؛ taste disturbance

**If a side effect occurs, if one of the side effects worsens or if you suffer from a side effect not mentioned in the leaflet, consult with the doctor. Reporting side effects**

Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on the link "Reporting Side Effects of Drug Treatment" found on the Ministry of Health homepage (www.health.gov.il) that directs you to the online form for reporting side effects.

Alternatively, a report can be made to "Unipharm Ltd.".

**5. HOW SHOULD LOTAN BE STORED?**

• Avoid poisoning! This medicine, and any other medicine, should be kept in a safe place out of the reach of children and/or infants in order to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by the doctor.

• Do not use **Lotan** after the expiry date (exp. date) that appears on the package. The expiry date refers to the last day of the indicated month.

• Store the medicine at a temperature below 25°C and in a place protected from light.

• Do not dispose of medicines in wastewater or household waste. Consult your pharmacist on how to dispose of medicines that are no longer necessary. Taking these measures will help protect the environment.

**6. FURTHER INFORMATION**

In addition to the active ingredient, the medicine also contains:

Lactose anhydrous; Microcrystalline cellulose; Pregelatinized starch; Magnesium stearate; Opadry white Y-1-7000.

What the medicine looks like and contents of the package:

**Lotan** is packed in trays (blister) inserted into a carton package. Each package has 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28 or 30 tablets. Not all package sizes may be marketed. **Lotan 12.5** tablets are white, film-coated, round and biconvex.

**Lotan 50** tablets are white, film-coated, round, biconvex, with a score line on one side. **Lotan 100** tablets are white, film-coated, oval, biconvex, with a score line on one side.

Registration holder: Unipharm Ltd., P.O.Box 21429, Tel Aviv, 6121301.

Manufacturer and address: Unipharm Ltd., "Mevo Carmel" Industrial Park. This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in November 2014, and was updated according to the Ministry of Health guidelines in October 2018.

Registration numbers of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of Health:

**Lotan 12.5:** 137 93 31629 01
**Lotan 50:** 137 94 31630 01
**Lotan 100:** 139 36 31707 01

**التبليغ عن أعراض جانبية**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط **تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي** الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية.

بدلاً من ذلك، بالإمكان التبليغ لشركة **يونيفارم م.ض.**.

**٥) كيفية تخزين لوتان؟**

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. إن إتخاذ هذه الإجراءات يساعد في الحفاظ على البيئة.

**If you forget to take Lotan**

If you forgot to take the daily dose, do not take a double dose. Take the next dose at the regular time and consult the doctor.

Adhere to the treatment regimen as recommended by the doctor.

**How can you contribute to the success of the treatment?**

It is important to continue taking **Lotan** as long as your doctor prescribes it for you, in order to maintain control of your blood pressure.

**Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take a medicine. Wear glasses if you need them.**
**If you have any further questions about use of the medicine, ask your doctor or pharmacist.**

**4. SIDE EFFECTS**

As with any medicine, use of **Lotan** may cause side effects in some users. Do not be alarmed by the list of side effects; you may not suffer from any of them.

**Stop using the medicine and refer to the doctor or proceed to the nearest emergency room if the following occurs:**

A severe allergic reaction (rash, itching, swelling of the face, lips, mouth or throat that may cause difficulty in swallowing or breathing). This is a serious but rare side effect that occurs at a frequency of 1-10 patients out of 10,000. You may need urgent medical treatment or hospitalization. The following side effects have been reported with **Lotan**:

*Common (may affect up to one person out of 10):* dizziness؛ low blood pressure (especially after increased loss of water from the body from within blood vessels, e.g., in patients with severe heart failure or under treatment with high dose diuretics)؛ dose-dependent effects of hypotension, such as a drop in blood pressure occurring when rising from a lying or sitting position؛ weakness؛ fatigue؛ too little sugar in the blood (hypoglycemia)؛ too much potassium in the blood (hyperkalemia)؛ changes in kidney function, including kidney failure؛ reduced number of red blood cells (anaemia)؛ increase in blood urea, serum creatinine and serum potassium in patients with heart failure

*Uncommon (may affect up to one out of 100 people):* sleepiness؛ headache؛ sleep disorders؛ feeling of increased heart rate (palpitations)؛ severe chest pain (angina pectoris)؛ shortness of breath (dyspnoea)؛ abdominal pain؛ severe constipation؛ diarrhoea؛ nausea؛ vomiting؛ hives (urticaria)؛ itching (pruritus)؛ rash؛ localised swelling (oedema)؛ cough

*Rare (may affect up to one out of 1,000 people):* hypersensitivity؛ angioedema؛ inflammation of blood vessels (vasculitis, including Henoch-Schönlein purpura)؛ numbness or tingling sensation (paraesthesia)؛ fainting (syncope)؛ very rapid and irregular pulse (atrial fibrillation)؛ stroke؛ inflammation of the liver (hepatitis)؛ elevated levels of alanine aminotransferase (ALT) in the blood, which usually resolves upon discontinuation of treatment

*Unknown (frequency cannot be estimated from the existing data):*

reduced number of thrombocytes؛ migraine؛ liver dysfunction؛ muscle and joint pain؛ flu-like symptoms؛ back pain and urinary tract infection؛ increased sensitivity to the sun (photosensitivity)؛ unexplained muscle pain with dark (tea coloured) urine (rhabdomyolysis)؛ impotence؛ inflammation of

**Adult patients with high blood pressure**

Treatment usually starts with 50 mg losartan (one **Lotan 50** tablet), once a day. The maximal blood pressure lowering effect should be achieved 3-6 weeks after beginning treatment. Sometimes, in certain patients, it might be necessary to later increase the dosage of the medicine to 100 mg losartan (one **Lotan 100** tablet), once daily. If you have the impression that the effect of losartan is too strong or too weak, please speak with your doctor or the pharmacist.

**Adult patients with high blood pressure, type 2 diabetes and protein in the urine**
Treatment usually starts with 50 mg losartan (one **Lotan 50** tablet), once a day.

Sometimes, in certain patients, it might be necessary to increase the dosage of the medicine to 100 mg losartan (one **Lotan 100** tablet), once daily, according to the effect of the medicine on the blood pressure. Losartan may be taken together with other blood pressure lowering medicines (e.g. diuretics, calcium channel blockers, alpha- or beta-blockers and centrally acting agents), as well as with insulin and other commonly used medicines that decrease the level of glucose in the blood (e.g. sulfonylureas, glitazones and glucosidase inhibitors).

**Adult patients with heart failure**
Treatment usually starts with 12.5 mg losartan (one **Lotan 12.5** tablet), once a day. Generally, the dose should be increased weekly, step-by-step (i.e., 12.5 mg daily during the first week, 25 mg daily during the second week, 50 mg daily during the third week, 100 mg daily during the fourth week, 150 mg daily during the fifth week) up to the maintenance dose as determined by your physician. The maximum dose is 150 mg (three **Lotan 50** mg tablets), once daily.

In the treatment of heart failure, losartan is usually given in combination with a diuretic (medicine that increases the amount of water that you excrete through your kidneys) and/or digitalis (medicine that helps to strengthen and improve heart activity) and/or a beta-blocker.

**Dosage in special patient groups**
The doctor may recommend a lower dosage, especially when starting treatment in certain patients, such as those treated with diuretics in high doses, in patients with liver impairment, or in patients over 75 years of age. Losartan should not be used in patients with severe liver impairment (see section 2.1 "Do not take Lotan if").

**Do not exceed the recommended dosage.**

**Method of administration**
Swallow the tablets whole with a glass of water. You should try to take your daily dose at about the same time each day. It is important that you continue to take **Lotan** until your doctor tells you otherwise.

**Lotan 12.5:** Do not halve the tablet.
**Lotan 50, Lotan 100:** If necessary, the tablet can be halved for immediate use. There is no information regarding crushing or chewing the tablet.

**If you take more Lotan than you should**
Symptoms of overdose are: low blood pressure, accelerated pulse, possible slowing of pulse.

If you took an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room, and bring the package of the medicine with you.

Your doctor may need to change your dose and/or to take other precautions:

If you are taking an ACE inhibitor or aliskiren (see also information in section 2.1 "Do not take **Lotan** if" and section 2.2 "Special warnings regarding use of **Lotan**").

If you have impaired kidney function, concomitant use of these medicines may lead to deterioration in kidney function.

Do not take losartan together with lithium-containing medicines without the close supervision of your doctor. Special precautionary measures (e.g., blood tests) may be appropriate.

**2.4 Taking Lotan with food and beverage:**
**Lotan** may be taken with or without food.

**2.5 Pregnancy and breast-feeding:**
**Pregnancy**

You must tell your doctor if you think you are pregnant (or **might become** pregnant). Generally, your doctor will recommend that you stop taking **Lotan** before you become pregnant or as soon as you know that you are pregnant and will recommend that you take another medicine instead of **Lotan**. **Lotan** is not recommended at the beginning of pregnancy and it must not be taken if you are more than 3 months pregnant, since it may cause serious harm to your baby if taken after the third month of pregnancy.

**Breast-feeding**
Tell your doctor if you are breast-feeding or about to start breast-feeding. **Lotan** is not recommended for breast-feeding mothers, and your doctor may choose another treatment for you if you wish to breast-feed, especially if your baby was just born, or was born prematurely.

Consult with your doctor or with a pharmacist before taking this medicine.

**2.6 Driving and operating machinery:**
No studies on the effects on the ability to drive or operate machinery have been performed.

**Lotan** is unlikely to affect your ability to drive or operate machinery. However, as with many other medicines used to treat high blood pressure, losartan may cause dizziness or drowsiness in some people. If you experience dizziness or drowsiness, you should consult your doctor before attempting to perform such activities.

**2.7 Important information about some of the ingredients of Lotan:**
**Lotan** tablets contain lactose (for the lactose content, see section 6). If you have been told by the doctor that you have an intolerance to certain sugars, contact your doctor before taking this medicine.

**Lotan** tablets contain potassium (for potassium content, see section 6).

**3. HOW SHOULD YOU USE LOTAN?**

Always take **Lotan** exactly as the doctor has told you. You should check with the doctor or pharmacist if you are uncertain.

Your doctor will determine the dosage and duration of treatment. Your doctor will determine the appropriate dose of **Lotan**, taking into account your condition and whether you are taking other medicines. It is important to continue taking **Lotan** for as long as your doctor prescribes it for you, in order to maintain control of your blood pressure.

baby if taken at this stage (see section 2.5 "Pregnancy and breast-feeding").

Before treatment with **Lotan**, it is important to tell the doctor if:

- you have a history of angioedema (swelling of the face, lips, throat, and/or tongue) (see also section 4, "Side Effects").
- you suffer from excessive vomiting or diarrhea leading to an extreme loss of fluids and/or salts from your body.
- you are receiving diuretics (medicines that increase the amount of water that you excrete through your kidneys) or are under dietary salt restriction leading to an extreme loss of fluids and salts from your body (see section 3 "How should you use **Lotan**?").
- you have a known narrowing or blockage of the blood vessels leading to your kidneys or if you have recently undergone a kidney transplant.
- you have a known narrowing or blockage of the blood vessels leading to your kidneys or if you have recently undergone a kidney transplant.
- your liver function is impaired (see sections 2.1 "Do not take **Lotan** if" and 3 "How should you use **Lotan**?").
- you suffer from heart failure, with or without kidney damage, or combined with severe and life-threatening cardiac arrhythmias. Special caution should be exercised when you are being treated with a beta-blocker (β-blocker) concomitantly.
- you have problems with your heart valves or heart muscle.
- you suffer from coronary heart disease (caused by reduced blood flow in the blood vessels of the heart) or from cerebrovascular disease (caused by reduced blood flow in the brain).
- you suffer from primary hyperaldosteronism (a syndrome caused by an impairment of the adrenal gland, and is associated with increased secretion of the hormone aldosterone by the gland).
- you are taking any of the following medicines used to treat high blood pressure:
  - an ACE inhibitor (for example: enalapril, lisinopril, ramipril), in particular if you have diabetes-related kidney problems.
  - aliskiren

Your doctor may check your kidney function, blood pressure, and the amount of electrolytes (e.g. potassium) in your blood at regular intervals.

See also information in section 2.1 "Do not take **Lotan** if".

- 2.3 Taking other medicines**
**If you are taking, or have recently taken, other medicines, including non-prescription medicines and nutritional supplements, you should inform the attending doctor or pharmacist.**
Be especially cautious if you are taking the following medicines while under treatment with **Lotan**:
- Other blood pressure lowering medicines, as they may further reduce your blood pressure. Blood pressure may also be lowered by one of the following medicines/classes of medicines: tricyclic antidepressants, antipsychotics, baclofen, amifostine.
  - Medicines that retain potassium or that may increase potassium levels (e.g. potassium supplements, potassium-containing salt substitutes or potassium-sparing medicines such as certain diuretics [amiloride, triamterene, spironolactone] or heparin).
  - Non-steroidal anti-inflammatory drugs - such as indomethacin, including COX-2 inhibitors (medicines that reduce inflammation, and can be used to help relieve pain), since they may reduce the blood pressure lowering effect of losartan.

#### PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The medicine is dispensed with a doctor's prescription only

## LOTAN 12.5, 50, 100 Tablets

**Composition:**

Each **Lotan 12.5** tablet contains:

Losartan potassium 12.5 mg

Each **Lotan 50** tablet contains:

Losartan potassium 50 mg

Each **Lotan 100** tablet contains:

Losartan potassium 100 mg

For the list of inactive and allergenic ingredients in the preparation, please see section 6.

**Read this leaflet carefully in its entirety before using the medicine.**

- This leaflet contains concise information about **Lotan**. If you have further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed to treat you. Do not pass it on to others. It may cause harm, even if it seems that their medical condition is similar to yours.

#### 1. WHAT IS LOTAN AND WHAT IS IT USED FOR?

##### 1.1 What is Lotan?

**Therapeutic group:** **Lotan** is an angiotensin II receptor antagonist.

##### 1.2 What is Lotan used for?

**Lotan 12.5 mg, 50 mg and 100 mg** are indicated for the treatment of heart failure.

**Lotan 50 and Lotan 100** are also indicated for the treatment of hypertension (high blood pressure), and to help lower the risk for cardiovascular events, such as stroke, in patients with high blood pressure and thickening of the left ventricle (the main chamber) of the heart.

**Lotan 50 and Lotan 100** also provide kidney protection by delaying the worsening of kidney disease in type 2 diabetic patients with protein excreted in their urine (proteinuria).

#### 2. BEFORE TAKING LOTAN

##### 2.1 Do not take Lotan if:

- you are sensitive (allergic) to losartan or to any of the other ingredients of this medicine (see section 6)
- you are more than 3 months pregnant (it is also better to avoid **Lotan** in early pregnancy - see section 2.5 "Pregnancy and breast-feeding")
- your liver function is severely impaired
- you have diabetes or impaired kidney function and you are being treated with a blood pressure lowering medicine containing aliskiren

**2.2 Special warnings regarding use of Lotan:**
Tell your doctor, pharmacist, or nurse before taking the medicine.

You must tell your doctor if you think you are pregnant (or might become pregnant). **Lotan** is not recommended at the beginning of pregnancy and it must not be taken if you are more than 3 months pregnant, since it may cause serious harm to your